

Преподаватель: Айдаева Фатима Жавидовна

Дата – 30.04.2020г (2 неделя)

3курс 1 группа на базе 9 классов

Тема: Злокачественные новообразования женских половых органов

2-Вариант

030. Первая стадия рака эндометрия разделяется на варианты (а, б, в) в зависимости
- а) от степени распространения опухоли за пределы матки
 - б) от степени инвазии опухоли в миометрий
 - в) от величины полости матки
 - г) от размеров матки
031. Наиболее часто при раке эндометрия I стадии производят
- а) экстирпацию матки с придатками и верхней третью влагалища
 - б) экстирпацию матки с придатками, верхней третью влагалища и лимфаденэктомию
 - в) расширенную экстирпацию матки с придатками по Вертгейму
 - г) верно а) и б)
 - д) верно все перечисленное
032. Профилактика развития рака эндометрия состоит
- а) в устранении нарушений овуляции
 - б) в своевременном лечении диабета, ожирения и гипертонической болезни
 - в) в применении гормональной контрацепции
 - г) верно а) и б)
 - д) во всем перечисленном
033. Тяжелая дисплазия эпителия шейки матки - это
- а) предрак
 - б) начальная форма рака
 - в) фондовый процесс
 - г) дисгормональная гиперплазия
034. Отличительной чертой внутриэпителиального рака шейки матки является все перечисленное, кроме
- а) отсутствия инвазии в подлежащую строму
 - б) сохранения базальной мембраны
 - в) клеточного атипизма во всем пласте эпителия
 - г) очагового проникновения группы клеток в строму
035. Скрининг-методом для выявления патологии шейки матки в современных условиях является
- а) визуальный осмотр
 - б) кольпоскопия
 - в) радионуклеидный метод
 - г) цитологическое исследование мазков
036. Микроинвазивный рак шейки матки называют "компенсированным" в связи с тем, что он имеет

- а) малую стромальную инвазию
- б) низкую потенцию к метастазированию
- в) раковые эмболы в лимфатических щелях
- г) верно а) и б)
- д) все перечисленное

037. Микроинвазивный рак шейки матки по своему клиническому течению сходен
- а) с тяжелой дисплазией
 - б) с внутриэпителиальным раком
 - в) с инвазивным раком
 - г) верно а) и б)
 - д) со всем перечисленным
038. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является
- а) экстирпация матки с придатками
 - б) экстирпация матки без придатков
 - в) криодеструкция
 - г) электроконизация
039. При внутриэпителиальном раке шейки матки у женщин 50 лет и старше с лечебной целью целесообразно производить
- а) экстирпацию матки с придатками
 - б) экстирпацию матки без придатков
 - в) криодеструкцию
 - г) электроконизацию
040. При микроинвазивном раке шейки матки у женщин репродуктивного возраста применяются все перечисленные виды лечения, кроме
- а) лазерной конизации
 - б) высокой ножевой ампутации шейки матки
 - в) операции Вертгейма
 - г) экстирпации матки без придатков
041. Комбинированный метод лечения больных с онкогинекологической патологией включает комбинацию двух методов (из числа указанных), кроме
- а) хирургического и химиотерапевтического
 - б) лучевого и химиотерапевтического
 - в) гормонотерапии и хирургического
 - г) хирургического и лучевого
 - д) всех перечисленных
042. Операция Вертгейма отличается от простой экстирпации матки удалением
- а) связок матки
 - б) параметральной клетчатки
 - в) подздошных лимфатических узлов
 - г) верхней трети влагалища и всего лимфатического коллектора, окружающего матку
 - д) всего перечисленного

043. Больные с какими заболеваниями шейки матки не должны состоять на учете у онколога-гинеколога?
- а) рецидивирующий полипоз
 - б) простая форма лейкоплакии
 - в) лейкоплакия с атипией
 - г) дисплазия
 - д) эритроплакия
044. Для диагностики трофобластической болезни наиболее эффективно определение
- а) хорионического гонадотропина
 - б) трофобластического б-глобулина
 - в) хорионического соматотропина
 - г) верно а) и б)
 - д) всего перечисленного
045. Наиболее часто хориокарцинома возникает после
- а) абортов
 - б) пузырного заноса
 - в) нормальных родов
 - г) преждевременных родов
046. Патогенетические варианты хориокарциномы
- а) хориокарцинома после нормальной беременности
 - б) хориокарцинома после патологической беременности
 - в) хориокарцинома в постменопаузе
 - г) верно а) и б)
 - д) верно все перечисленное
047. Наличие лютеиновых кист у больных хориокарциномой матки влияет на прогноз
- а) благоприятно
 - б) неблагоприятно
 - в) не имеет влияния
 - г) неизвестно
048. Химиотерапия у больных после удаления пузырного заноса
- а) не рекомендуется
 - б) обязательна
 - в) зависит от морфологической картины
 - г) на усмотрение врача, в зависимости от клинических и лабораторных данных
049. Больным с хориокарциномой в зависимости от распространенности процесса целесообразно проводить
- а) монокимиотерапию
 - б) полихимиотерапию
 - в) противовоспалительную терапию
 - г) верно а) и б)

д) все перечисленное

050. К раку яичников относятся

- а) все злокачественные опухоли яичника
- б) только герминогенные опухоли
- в) только стромальные опухоли
- г) только опухоли эпителиального происхождения

051. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников у молодых женщин

- а) удаление придатков
- б) удаление опухоли
- в) резекция яичника
с возможно большим сохранением здоровой ткани органа
- г) надвлагалищная ампутация матки с придатками на стороне поражения
- д) верно б) и в)